

# Regard santé

## l'aire de Saint-Just-en-Chaussée

### → Présentation de l'aire

L'aire de Saint-Just-en-Chaussée comprend deux cantons : Breteuil et Saint-Just-en-Chaussée.

Au recensement de 2006, on dénombrait **28 690 habitants**, soit une densité de 68,0 habitants au km<sup>2</sup>. Cette densité est plus faible que celles du département (135,3 h/km<sup>2</sup>), de la région (97,6 h/km<sup>2</sup>) et du pays (112,9 h/km<sup>2</sup>).

La proportion de **moins de 25 ans** dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée en 1999 est légèrement supérieure à celle des trois entités géographiques de référence : 34,7 % contre 34,0 % dans l'Oise, 33,1 % en Picardie et 30,9 % en France métropolitaine.


Le taux de personnes de **75 ans et plus** dépasse également le taux départemental (6,2 % dans l'aire contre 5,5 % dans l'Oise) mais reste inférieur aux taux régional et national (6,6 % et 7,7 % respectivement).

L'**indice conjoncturel de fécondité** (ICF) dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, avec 2,20 enfants par femme, dépasse largement ceux de l'Oise (2,07), de la Picardie (2,00) et de la France métropolitaine (1,90).

La proportion de naissances de **mères mineures** de l'aire (6,3 ‰) se situe en dessous des niveaux départemental (7,6 ‰) et régional (9,6 ‰), mais demeure au-dessus du niveau national (5,7 ‰). Cela représente 10 naissances par an entre 2003 et 2006.

Entre 2001 et 2004, il y a eu 973 naissances d'habitants de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, dont 29,1 % ont eu lieu dans l'aire de Clermont, 26,9 % dans l'aire de Compiègne et 25,2 % dans l'aire de Beauvais.

Sur la même période, il y a eu 932 décès d'habitants de l'aire : 27,8 % de ces décès ont eu lieu dans l'aire de Compiègne, 22,1 % dans l'aire de Beauvais et 19,6 % dans l'aire de Clermont.



Sources : Insee, OR2S

#### SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S



l'Assurance  
Maladie

Service Médical  
Nord Pas-de-Calais Picardie

# → Données sociales


Des revenus moyens moins élevés, mais moins d'allocataires du RMI, de chômeurs de longue durée et de bénéficiaires de la CMU

Le **revenu moyen** imposable dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée est de 14 598 euros, ce qui est très inférieur aux revenus moyens de l'Oise (17 447 €), de Picardie (15 938 €) et de France métropolitaine (17 165 €).

De même, la part de foyers **non imposables** dans l'aire (49,9 %) reste largement au-dessus des trois niveaux de comparaison (42,5 % dans l'Oise, 47,8 % en Picardie et 46,2 % en France métropolitaine).

En 2004, le taux de bénéficiaires d'une **aide ménagère** dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée est de 23,1 pour 1 000 personnes de 65 ans et plus, soit plus que les taux isarien (20,7 ‰) et picard (21,3 ‰).

En 2005, le taux de bénéficiaires de l'**allocation personnalisée d'autonomie** (APA) à domicile est de 89,8 pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, soit plus que dans l'Oise (72,7 ‰) mais moins qu'en Picardie (117,7 ‰) et qu'en France métropolitaine (149,4 ‰).



En 2004, on dénombre 1 192 **demandeurs d'emploi en fin de mois** (DEFM) de catégorie 1 dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée.

Parmi eux, le pourcentage de personnes de moins de 25 ans est de 25,9 %, soit un peu plus qu'au niveau du département (23,4 %) et de la région (24,8 %).

Inversement, le taux de chômeurs de plus de 50 ans est un peu moins élevé que dans l'Oise et la Picardie (10,6 % dans l'aire, contre 14,3 % et 13,6 % respectivement).


La proportion de chômeurs de longue durée (DEFM depuis 1 an ou plus) est également plus faible dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée (29,2 %) que dans l'Oise (30,6 %) et qu'en Picardie (33,9 %).

En 2004, on dénombre dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée 288 allocataires du **revenu minimum d'insertion** (RMI). Le taux d'allocataires du RMI dans l'aire est de 29,2 pour 1 000 ménages, soit un taux largement inférieur à ceux de l'Oise (36,8 ‰), de Picardie (42,3 ‰) et de France métropolitaine (41,9 ‰).

De la même manière, les taux de RMI parmi les familles monoparentales (109,5 ‰) et parmi les couples (9,1 ‰) de l'aire sont inférieurs à ceux du département (116,9 ‰ et 11,2 ‰) et de la région (133,4 ‰ et 14,5 ‰).

Le taux de Rmistes de 25 à 49 ans reste également en dessous des taux départemental et régional (21,3 pour 1 000 personnes de 25-49 ans dans l'aire contre 26,6 ‰ et 33,4 ‰ respectivement).

2



L'aire de Saint-Just-en-Chaussée compte 241 bénéficiaires de la **couverture maladie universelle (CMU) de base**, soit un taux de 8,5 pour 1 000 habitants, ce qui reste en dessous des taux isarien (13,6 ‰), picard (16,1 ‰) et national (22,1 ‰).

De la même façon, le taux de bénéficiaires de la **CMU complémentaire** de l'aire (62,6 ‰) se situe en dessous des taux de l'Oise (70,7 ‰), de Picardie (89,6 ‰) et de France métropolitaine (67,5 ‰). Ceci représente 1 782 personnes.

# → Professionnels de santé

## Des professionnels de santé moins nombreux et plus âgés

En novembre 2006, on dénombre 22 **médecins généralistes** dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, soit une densité de 7,6 pour 10 000 habitants, ce qui est inférieur aux taux des trois zones géographiques de référence (8,6 pour l'Oise, 9,7 pour la Picardie et 11,2 pour la France métropolitaine).

Les femmes représentent 27,3 % des médecins généralistes, soit moins que dans le département (30,5 %), la région (27,6 %) et le pays (29,4 %).

L'âge moyen des médecins généralistes de l'aire est de 48,9 ans, soit un peu moins que dans l'Oise (49,6 ans), en Picardie (49,4 ans) et en France métropolitaine (49,8 ans). Cependant, 36,4 % des médecins ont 55 ans ou plus, ce qui est plus que dans ces trois zones de comparaison (respectivement 31,6 %, 31,5 % et 32,3 %).

On recense 5 **médecins spécialistes** dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, soit une densité de 1,7 pour 10 000 habitants, ce qui est, là encore, en dessous des densités de l'Oise et de Picardie (5,2 chacune) et est plus de deux fois inférieure au taux national (8,8). On compte une seule femme parmi ces médecins spécialistes.

L'âge moyen des spécialistes de l'aire est de 54,4 ans, soit 1,4 ans de plus que la moyenne isarienne et 2,4 ans de plus que les moyennes picarde et française. Le pourcentage de médecins spécialistes de 55 ans ou plus (60,0 %) est très supérieur à ceux de l'Oise (41,0 %), de Picardie (37,1 %) et de France métropolitaine (39,3 %).



On compte 9 **dentistes** dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée en avril 2007, soit une densité de 3,1 pour 10 000 habitants inférieure à celles de l'Oise et de Picardie (4,0 chacune) et à celle de la France métropolitaine (6,2). Les femmes représentent 22,2 % des dentistes, soit moins que dans le département (28,4 %), la région (29,2 %) et le pays (33,9 %).

L'âge moyen des dentistes est plus élevé que dans les trois zones de référence (53,7 ans dans l'aire soit 5,3 ans de plus que l'Oise, 5,5 ans de plus que la Picardie et 5,9 ans de plus qu'en France métropolitaine) et 44,4 % des dentistes de l'aire ont 55 ans ou plus.

En avril 2007, 24 **auxiliaires médicaux** exercent dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, soit une densité de 8,3 pour 10 000 habitants, ce qui est moindre que dans l'Oise (11,8), la Picardie (13,8) et en France métropolitaine (21,9). Sept auxiliaires médicaux sur dix (70,8 %) sont des femmes, soit un peu plus que le niveau national (69,0 %). L'âge moyen est de 45,4 ans, soit 1,9 ans de plus que dans l'Oise, 2,1 ans de plus qu'en Picardie et 1,8 ans de plus qu'en France métropolitaine. Parmi eux, 29,2 % ont 55 ans ou plus, ce qui est supérieur aux niveaux du département (16,9 %), de la région (19,1 %) et du pays (18,3 %).

On compte 13 **infirmiers** exerçant dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, soit une densité de 4,5 pour 10 000 habitants, ce qui est moins que dans l'Oise (5,5), qu'en Picardie (7,1) et qu'en France métropolitaine (11,2). Les femmes représentent 92,3 % des infirmiers libéraux contre 87,9 % dans le département, 88,5 % dans la région et 84,6 % au niveau national. L'âge moyen des infirmiers libéraux est de 44,5 ans soit presque le même que dans les trois régions de référence (44,1 ans dans l'Oise, 44,6 ans en Picardie et 44,9 en France métropolitaine).

En 2004, on recense 8 **pharmacies** sur l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, soit une densité de 2,9 pour 10 000 habitants, ce qui est inférieur aux densités isarienne (3,1) et picarde (3,3).



Sources : Adeli, Insee, OR2S

Entre le 1<sup>er</sup> juillet 2005 et le 30 juin 2006, les habitants de l'aire ont consulté un médecin généraliste de l'aire dans 66,5 % des cas. Par ailleurs, 6,6 % des consultations ont eu lieu dans l'aire de Clermont et 5,3 % dans l'aire de Formerie.

Les consultations d'ophtalmologie ont suscité de plus nombreuses migrations en raison du manque de spécialistes. Ainsi, 29,1 % de ces consultations se sont déroulées à Beauvais, 25,2 % à Montdidier et 14,6 % à Clermont.


Même situation en ce qui concerne les consultations de gynécologie médicale : 28,3 % dans l'aire de Montdidier, 24,5 % à Compiègne et 24,2 % à Amiens. De même pour les consultations de gynéco-obstétrique qui ont eu lieu à 33,3 % dans l'aire de Beauvais, à 19,0 % dans l'aire d'Amiens, à 17,2 % dans l'aire de Clermont et à 16,7 % dans l'aire de Compiègne.

# → Mortalité et ALD

Une espérance de vie moins élevée et davantage de décès prématurés

L'**espérance de vie** à la naissance des hommes de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée est de 74,1 ans, soit autant qu'en Picardie mais 0,7 an de moins que dans l'Oise et 1,8 an de moins qu'en France métropolitaine.

Pour les femmes, l'espérance de vie dans l'aire est de 81,7 ans, ce qui est égal à l'espérance de vie picarde mais est légèrement inférieur à celles de l'Oise (82,0 ans) et de la France métropolitaine (83,2 ans).



Le taux de **mortalité générale** est de 1 015,1 pour 100 000 habitants, ce qui situe l'aire de Saint-Just-en-Chaussée au même niveau que l'Oise (1 014,9), en dessous du taux picard (1 052,7), mais au-dessus du taux français (911,3). Le nombre de décès total dans l'aire est de 230 par an entre 2000 et 2004.

Le taux de **mortalité prématurée**, qui correspond au taux de mortalité avant 65 ans, est de 256,7 pour 100 000 habitants de l'aire. Il reste plus élevé que les taux isarien (243,2) et national (221,5) mais est inférieur au taux picard (262,7).

Les **maladies de l'appareil circulatoire** et les **tumeurs malignes** sont à l'origine de plus de la moitié des décès féminins (55,6 %) et masculins (57,1 %) dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée.

La première cause de décès chez les femmes correspond aux maladies de l'appareil circulatoire (31,3 %), la deuxième est le cancer (24,3 %). Chez les hommes, le cancer arrive en première position (34,1 %), suivi des

maladies de l'appareil circulatoire (23,0 %) puis des causes externes (11,9 % des décès masculins). La troisième cause de mortalité féminine correspond aux maladies de l'appareil respiratoire (7,6 %).

Le taux de mortalité par **suicide** dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée est de 22,5 pour 100 000 habitants, ce qui est proche de la Picardie (23,1) et supérieur à l'Oise et à la France métropolitaine (20,6 et 18,0).

Le taux de mortalité par **accident de la circulation** est plus élevé dans l'aire (21,3 pour 100 000) que dans le département (14,7), la région (14,3) et le pays (10,8).

Le taux de **séjours hospitaliers** en 2004-2005 dans l'aire est de 283,2 pour 1 000 habitants, ce qui correspond à un nombre annuel de 7 743 séjours. Ce taux est inférieur à ceux de l'Oise (299,9 ‰) et de Picardie (289,3 ‰).

Entre 2004 et 2005, il y a eu 487 **admissions en affection de longue durée** (ALD) par an, dont 55,0 % d'hommes.

Les deux premières causes d'admissions en ALD sont les tumeurs malignes (72 hommes et 47 femmes) et le diabète (46 hommes et 42 femmes).

Le taux d'admissions en ALD pour tumeurs malignes dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée est de 485,7 pour 100 000 habitants, soit plus que dans l'Oise (482,4) et qu'en France métropolitaine (483,1), mais moins qu'en Picardie (497,8).

Le taux d'admission en ALD pour **diabète** est largement plus élevé dans l'aire (346,6 pour 100 000) que dans les trois zones de référence (308,2 dans l'Oise, 311,4 en Picardie et 266,5 en métropole).

Le **diabète** compliqué induit à terme des affections neurologiques, ophtalmologiques, rénales ou cardiovasculaires. Une étude met en évidence une non prise en charge en ALD d'environ un cas sur quatre.

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Tumeurs malignes	47	21,5	1	72	26,9	1
Diabète	42	19,0	2	46	17,3	2
Hypertension artérielle sévère	22	9,9	3	23	8,4	4
Affections psychiatriques longue durée	21	9,6	4	18	6,8	6
Pathologies cardiaques graves	15	7,0	5	17	6,5	7
Maladie d'Alzheimer et autres démences	13	6,0	6	5	2,0	10
Maladie coronaire	9	4,2	7	28	10,5	3
Accident vasculaire cérébral	8	3,5	8	6	2,2	9
Artériopathies chroniques graves	6	2,7	9	19	7,0	5
Insuffisance respiratoire chronique grave	5	2,4	10	7	2,6	8
Autres causes de nouvelles admissions	31	14,3	-	26	9,7	-
<b>Total</b>	<b>219</b>	<b>100</b>		<b>268</b>	<b>100</b>	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

# → Maladies de l'appareil circulatoire

Moins d'admissions en ALD et moins de séjours hospitaliers mais une mortalité plus élevée dans l'aire

Les nouvelles admissions annuelles en ALD pour **maladies cardiovasculaires** dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée sont au nombre de 153 (60 femmes et 93 hommes), soit un taux de 626,0 pour 100 000 habitants en 2004-2005. Ce taux est moindre que celui de l'Oise (638,7), mais plus élevé qu'en Picardie (602,0) et qu'en France métropolitaine (586,1).

Le taux de séjours hospitaliers en 2004-2005 pour ces pathologies est de 26,1 pour 1 000 dans l'aire (665 séjours annuels), ce qui est inférieur aux taux de l'Oise (27,3 ‰) et de Picardie (27,8 ‰).

Le taux de mortalité pour ces pathologies est de 283,0 pour 100 000 habitants, ce qui reste supérieur au taux français (271,8), mais inférieur aux taux isarien (297,8) et picard (314,2).


En 2004-2005, on a recensé 114 séjours hospitaliers par an pour **cardiopathie ischémique** dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, soit un taux de 4,4 pour 1 000 habitants, ce qui est inférieur aux taux de l'Oise (6,0 ‰) et de Picardie (6,1 ‰).

Le taux de mortalité par cardiopathie ischémique est également largement inférieur dans l'aire aux taux des trois zones de référence (58,3 pour 100 000 habitants contre 82,5 dans l'Oise, 86,6 en Picardie et 74,6 en France métropolitaine).

Le taux d'admission en ALD pour **accident vasculaire cérébral** (AVC) dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée est de 56,4 pour 100 000. Ce taux est proche des taux de l'Oise (57,4) et de Picardie (56,1), mais inférieur au taux national (60,5). Ceci représente 14 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005 (6 hommes, 8 femmes).

Le taux de séjours hospitaliers de l'aire pour AVC est de 2,5 pour 1 000, soit 61 séjours annuels en 2004-2005. Ce taux est encore inférieur aux taux isarien (3,3 ‰) et picard (2,8 ‰).

De même, le taux de mortalité par AVC est plus faible dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée que dans l'Oise (64,4 pour 100 000 contre 67,5) et qu'en Picardie (69,6) mais est légèrement supérieur au taux national (63,4).



Le taux d'admissions en ALD pour **pathologie cardiaque grave** est de 133,9 pour 100 000 dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée (33 admissions annuelles entre 2004 et 2005). Ce taux est inférieur à ceux observés dans l'Oise (153,1), en Picardie (149,7) et en France métropolitaine (140,1).

Le taux d'admissions en ALD pour **maladie coronarienne** de l'aire se situe légèrement au-dessus des taux isarien et national (149,1 pour 100 000 contre 147,1 et 140,8 respectivement) mais en dessous du taux picard (150,0). Ceci représente 37 nouvelles admissions annuelles.

Le taux d'admissions en ALD pour **hypertension artérielle** sévère (HTA) est de 183,2 pour 100 000 habitants de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée (44 admissions annuelles entre 2004 et 2005). Ceci est supérieur aux taux régional et national (164,4 et 170,2), mais reste inférieur au taux de l'Oise (203,9).

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une exonération du ticket modérateur pour une autre affection de longue durée.

# → Cancers et tumeurs


Une mortalité plus élevée pour le cancer de la prostate, mais plus basse pour le cancer du sein

Le taux d'admissions en ALD pour **tumeurs malignes** est de 485,7 pour 100 000 habitants dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée.

Ce taux est supérieur aux taux de l'Oise (482,4) et de France métropolitaine (483,1), mais est inférieur au taux picard (497,8). Cela représente 119 nouvelles admissions par an dans l'aire entre 2004 et 2005 (72 hommes et 47 femmes).

Le taux de séjours hospitaliers pour tumeurs malignes est de 26,4 pour 1 000 habitants dans l'aire, soit moins que dans l'Oise (26,9 ‰) mais plus qu'en Picardie (24,3 ‰). En 2004-2005, il y a eu 695 séjours annuels pour tumeurs malignes dans l'aire.


Le taux de mortalité pour les tumeurs malignes est de 283,5 pour 100 000 habitants de l'aire en 2000-2004, ce qui est supérieur aux taux isarien (278,7) et national (257,8) mais reste inférieur au taux picard (286,6).



Le taux d'admissions en ALD pour **cancer de la prostate** dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée se maintient largement au-dessus des taux des trois zones géographiques de référence (281,2 pour 100 000 dans l'aire en 2004-2005, contre 203,9 dans l'Oise, 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine). Ceci représente 32 admissions annuelles dans l'aire.

On enregistre également 58 séjours hospitaliers par an pour cancer de la prostate en 2004-2005, soit un taux de séjours de 4,8 pour 1 000, soit plus que dans l'Oise et qu'en Picardie (3,9 ‰ pour chaque).

Enfin, le taux de mortalité par cancer de la prostate est de la même manière plus élevé dans l'aire que dans le département (58,2 pour 100 000 contre 50,2), la région (53,8) et qu'au niveau national (45,1).




Le taux d'admissions en ALD pour **cancer du sein** est de 150,9 pour 100 000 dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, ce qui est bien en dessous des taux de l'Oise (169,8), de la Picardie (172,6) et de la France métropolitaine (175,3). Ceci correspond à 12 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005.

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer du sein est plus faible que les taux isarien et picard en 2004-2005 (4,1 pour 1 000 dans l'aire contre 4,9 ‰ dans l'Oise et 4,4 ‰ en Picardie). Ceci représente 54 séjours de femmes par an dans l'aire.

Le taux de mortalité pour ce cancer est également plus bas dans l'aire : 28,4 pour 100 000 à Saint-Just-en-Chaussée contre 36,6 dans le département, 37,3 dans la région et 33,2 au niveau national.

# → Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

En 2004-2005, 11 habitants de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée ont été admis annuellement en ALD pour **cancer du côlon-rectum** (6 hommes et 5 femmes), soit un taux d'admissions en ALD de 44,5 pour 100 000. Ce taux est inférieur à ceux de l'Oise (45,8), de Picardie (46,8) et de France métropolitaine (48,4).

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer colo-rectal dans l'aire est de 1,9 pour 1 000 (48 séjours annuels en 2004-2005), soit en dessous des taux isarien et picard (respectivement 2,5 ‰ et 2,3 ‰).

Le taux de mortalité pour ce cancer est de 26,5 pour 100 000 habitants, soit un taux proche de celui du département (26,1) mais inférieur à ceux de la région (28,9) et du niveau national (27,8).

Le taux de séjours hospitaliers pour **cancer des voies aérodigestives supérieures** (VADS) est proche de ceux des entités géographiques de référence : 1,3 pour 1 000 dans l'aire (soit 35 séjours par an entre 2004 et 2005, dont 33 hommes) contre 1,5 ‰ dans l'Oise et en Picardie.

Inversement, le taux de mortalité par cancer des VADS dans l'aire (24,4 pour 100 000 en 2000-2004) est supérieur à ceux de l'Oise (20,3), de la Picardie (22,2) et de la France métropolitaine (17,3).

Le taux de séjours hospitaliers pour **tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon** en 2004-2005 est de 3,7 pour 1 000 dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, ce qui est supérieur aux taux de l'Oise (3,3 ‰) et de Picardie (2,8 ‰). Ceci représente 95 séjours hospitaliers par an dans l'aire, dont 81 pour des hommes.

La mortalité pour ce cancer est de 48,3 pour 100 000 dans l'aire en 2000-2004 ce qui est inférieur aux taux isarien (49,0), et picard (50,0) mais supérieur au taux national (44,0).

# → Asthme

En 2006, 2 024 assurés du régime général ont **reçu un traitement contre l'asthme\*** (1 053 femmes et 971 hommes), quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit **9,4 % des assurés** de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée. Ce taux est proche de ceux de l'Oise (9,5 %) et de la Picardie (10,3 %). Les femmes et les hommes ont des taux semblables (9,4 % et 9,5 %).

Les 0-12 ans sont 10,2 % à avoir reçu un traitement pour cette pathologie dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée (8,5 % des filles et 11,9 % des garçons), soit 442 jeunes en 2006. Ce taux est légèrement inférieur aux taux départemental (11,5 %) et régional (12,0 %).

\* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.


# → Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Moins d'admissions en ALD pour la maladie d'Alzheimer mais plus de remboursements de psychotropes

En 2004-2005, 39 habitants de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée ont été admis en ALD par an pour **affections psychiatriques de longue durée** (18 hommes et 21 femmes), soit un taux de 143,2 pour 100 000, ce qui situe l'aire au-dessus des taux de l'Oise et de la Picardie (139,6 et 131,9 respectivement), mais en dessous du taux national (169,8).


Le taux de séjours hospitaliers en 2004-2005 pour troubles mentaux et comportementaux est de 5,1 pour 1 000 habitants, soit 140 séjours annuels. Ce taux est inférieur à ceux de l'Oise (10,4 ‰) et de la Picardie (7,5 ‰).

L'aire de Saint-Just-en-Chaussée a enregistré 18 nouvelles admissions par an en ALD pour la **maladie d'Alzheimer** entre 2004 et 2005, soit un taux de 83,6 pour 100 000. Ce taux est inférieur à ceux de l'Oise (91,7), de la Picardie (89,5) et de la France métropolitaine (86,2).



En 2006, 52 personnes de 70 ans et plus affiliées au régime général ont reçu un **traitement anti-Alzheimer** dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée (16 hommes et 36 femmes), soit un taux de 2,5 %, ce qui est pratiquement équivalent au pourcentage observé dans le département (2,6 %) mais est inférieur à celui de la région (2,8 %).

Les femmes de l'aire sont davantage traitées que les hommes (2,7 % des femmes contre 2,1 % des hommes) mais le sont moins que les Isariennes (2,9 % des femmes habitants l'Oise) et que les Picardes (3,2 % des femmes habitants la Picardie).



En 2006, 4 697 habitants de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée ont été **remboursés au moins une fois pour un psychotrope**, soit 23,7 % des assurés, ce qui est plus que dans le département (22,1 %) mais moins qu'en région (24,1 %). Il s'agit en majorité de femmes (28,9 % des femmes contre 17,9 % des hommes de l'aire).

Les psychotropes les plus remboursés sont les **anxiolytiques**. Ils ont été remboursés à 3 405 personnes, soit 16,9 % des assurés de l'aire (21,4 % des femmes et 11,9 % des hommes), ce qui est plus que dans l'Oise (15,0 %) et qu'en Picardie (16,4 %).

Les deuxièmes psychotropes les plus remboursés sont les **antidépresseurs** qui ont été remboursés à 1 504 habitants de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, soit 7,6 % des habitants (10,6 % des femmes et 4,2 % des hommes), ce qui est proche des niveaux départemental (7,7 %) et régional (8,3 %).

Sur la même période, 1,3 % des assurés de l'aire (1,3 % des femmes et 1,2 % des hommes) ont été remboursés pour des **neuroleptiques** (soit 245 personnes), ce qui est légèrement moins que dans l'Oise (1,5 %) et la Picardie (1,6 %).

Les **normothymiques**, utilisés dans le traitement des troubles bipolaires, les produits de **substitution aux opiacés** et les traitements de la **dépendance à l'alcool** ont été remboursés à moins de 1 % des habitants de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée : respectivement 0,2 % (51 personnes), 0,2 % (45 personnes) et 0,4 % (80 personnes).

*Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).*

# → Prévention


Un taux de dépistage du cancer du sein plus élevé, des vaccinations plus fréquentes, mais un suivi dentaire moins important

Durant le **dépistage organisé du cancer du sein** de 2005-2006, 1 763 mammographies ont été réalisées pour des assurées de Saint-Just-en-Chaussée.

Le taux de dépistage est de 52,0 % des femmes entre 50 et 74 ans dépistées, soit plus qu'au niveau départemental, régional et national (43,8 %, 45,5 % et 47,1 % respectivement).


À l'inverse, seules 21,1 % des femmes de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée ont bénéficié d'un **frottis** en 2006, soit 5 867 femmes.

Le pourcentage de femmes ayant eu un frottis est proche du taux picard (20,8 %) mais inférieur au taux isarien (24,2 %).



Entre 2000 et 2003, 14,9 % des femmes de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée ayant accouché ont eu **moins de sept consultations prénatales**, soit plus que dans l'Oise (10,7 %), mais un peu moins qu'en Picardie (15,7 %).

Le taux de **prématurés** dans l'aire est de 5,6 %, ce qui est similaire au taux picard, mais un peu supérieur au taux isarien (5,3 %).



En 2006, 69,7 % des habitants de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée de 65 ans et plus ont été **vaccinés contre la grippe**, ce qui est supérieur aux taux du département et de la région (62,3 % et 64,9 % respectivement).

Par ailleurs, les hommes de l'aire sont davantage vaccinés que les femmes (72,0 % des hommes de 65 ans et plus contre 68,2 % des femmes de la même tranche d'âge), comme au niveau du département (62,6 % des Isariens, 62,2 % des Isariennes) et de la région (66,1 % des Picards, 64,2 % des Picardes).

Les personnes en ALD de moins de 65 ans sont 44,8 % à être vaccinées contre la grippe en 2006, contre 41,1 % dans l'Oise et 46,7 % en Picardie.

Les femmes sont ici plus nombreuses que les hommes à être vaccinées (46,3 % des femmes de l'aire contre 43,6 % des hommes), comme dans le département (41,7 % des Isariennes contre 40,6 % des Isariens) et la région (47,6 % des Picardes contre 46,1 % des Picards).

Dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée, 90,6 % des enfants de 2 ans nés en 2004 ont été vaccinés contre la **rougeole, les oreillons, et la rubéole**, ce qui est légèrement inférieur au taux de l'Oise (91,3 %) et supérieur à celui de la région (89,2 %).

Le taux de couverture vaccinale contre la **diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite** est de 89,7 % des enfants de 2 ans nés en 2004 de l'aire. Ce taux est inférieur à ceux observés aux niveaux du département et de la région (91,7 % et 91,3 % respectivement).


Plus de neuf enfants sur dix (92,9 %) ont été vaccinés par le **BCG**, ce qui est bien supérieur aux taux de l'Oise (87,4 %) et de la Picardie (84,6 %).

Le vaccin contre l'**hépatite B** possède la plus faible couverture vaccinale dans l'aire avec seulement 56,1 % des enfants de 2 ans vaccinés. Mais ce taux est supérieur aux taux de l'Oise (51,5 %) et de Picardie (52,7 %).

Seulement un quart des enfants de 12 ans de l'aire de Saint-Just-en-Chaussée (26,4 %) a **consulté un chirurgien-dentiste et/ou un stomatologue** entre le 1<sup>er</sup> août 2005 et le 31 juillet 2007, ce qui est bien inférieur aux taux isarien (33,7 %) et picard (36,9 %).

Presque un enfant sur cinq (19,6 %) a subi une intervention (contre 24,7 % dans l'Oise et 27,4 % en Picardie) avec 41 enfants qui ont bénéficié de soins conservateurs, 32 d'actes chirurgicaux et 66 d'actes d'orthodontie.

# → Graphiques polaires




Sources : DGI, ANPE-DRTEFP, Caf, MSA, Insee, Conseils généraux 02, 60 et 80, OR2S

L'aire de Saint-Just-en-Chaussée a des taux proches de la Picardie pour les revenus moyens, le taux de chômage de longue durée et la densité de logements sociaux (rapports de 0,9).

Le taux de RMI est par contre inférieur de 30 % dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée par rapport à la moyenne picarde (rapport de 0,7).

Tandis que le taux d'APA à domicile est moins élevé dans l'aire qu'en Picardie (rapport de 0,8), le taux d'aide ménagère à domicile reste proche du taux picard (rapport de 1,1).

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie. La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



Sources : Inserm CépiDc, Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

L'aire de Saint-Just-en-Chaussée est assez proche des niveaux régional et national concernant les mortalités et les affections de longue durée (rapports de 0,9 à 1,1).

Pour l'ensemble des ALD, le rapport entre les niveaux régional et national et le niveau de l'aire est de 1,0.

## Aide à la lecture

Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.


Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

Concernant la prévention, l'aire de Saint-Just-en-Chaussée présente un taux de dépistage organisé du cancer du sein légèrement supérieur à celui de la Picardie (rapport de 1,1) et un pourcentage de frottis réalisés équivalent à la région.

La situation est identique en ce qui concerne les vaccinations contre le grippe des plus de 65 ans et contre la rougeole, les oreillons et la rubéole des enfants de 2 ans (rapports de 1,0 et 1,1).

Inversement, au niveau des soins et des consultations dentaires des enfants de 12 ans, l'aire montre des taux inférieurs à la moyenne régionale (rapports de 0,7).



## → Analyse et spécificité de l'aire

### Spécificités de l'aire

L'aire de Saint-Just-en-Chaussée a davantage de jeunes de moins de 25 ans et une forte fécondité.

Les revenus moyens sont plus faibles dans l'aire que dans la région et le pays, mais on observe également moins de chômeurs de longue durée et d'allocataires de RMI.

Cette aire présente des densités de professionnels de santé plus faibles que les niveaux régional et national concernant les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les dentistes, les auxiliaires médicaux et les infirmiers. Par ailleurs, ces professionnels de santé sont globalement plus âgés que dans les entités de référence.

Les cancers sont plus importants dans l'aire par rapport au département et au niveau national, pour les admissions en ALD et la mortalité. Ainsi, la mortalité par cancer de la prostate y est plus élevée.

Par contre, le cancer du sein a une mortalité plus basse, pouvant certainement être mise en rapport avec un fort taux de dépistage organisé du cancer du sein.

Enfin, si la vaccination infantile est plutôt bien suivie dans l'aire, il n'en est pas de même pour les consultations bucco-dentaires des enfants de douze ans. Le faible pourcentage d'enfants consultant un dentiste peut être mis en parallèle avec la faible densité de ces professionnels de santé.

### Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

# → Ce qu'il faut retenir...

L'aire de Saint-Just-en-Chaussée compte 515 nouvelles admissions en affections de longue durée (ALD) par an entre 2004 et 2005. Ceci représente un taux de 2 067,2 nouveaux bénéficiaires pour 100 000 habitants, ce qui est supérieur aux taux de l'Oise (2 057,1), de la Picardie (2 054,0) et de la France métropolitaine (2 005,3).

L'espérance de vie à la naissance est de 74,1 ans pour les hommes de l'aire en 2000-2004 et de 81,7 ans pour les femmes.

## Mortalité générale

La mortalité générale dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée est de 1 015,1 pour 100 000 habitants, soit de niveau équivalent au taux départemental (1 014,9), de niveau inférieur au taux picard (1 052,7), mais de niveau supérieur au taux français (911,3).

## Maladies de l'appareil circulatoire

Les maladies de l'appareil circulatoire ont entraîné moins d'hospitalisations qu'au niveau du département et de la région (26,1 ‰ contre 27,3 ‰ et 27,8 ‰ respectivement).

Les admissions en ALD pour ces pathologies sont plus élevées dans l'aire (626,0 pour 100 000) que les taux isarien (638,7), picard (602,0) et national (586,1).

Le taux de mortalité par maladies cardiovasculaires est de 283,0 pour 100 000 habitants de l'aire, ce qui est plus que le taux national (271,8) mais moins que les taux départemental (297,8) et régional (314,2).

## Cancers

Les cancers sont plus nombreux en termes d'ALD et de mortalité dans l'aire que dans le département et qu'au niveau national, mais moins nombreux qu'en région.

Le taux de mortalité par cancer de la prostate est plus élevé dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée que dans l'Oise (58,2 pour 100 000 contre 50,2), la Picardie (53,8) et la France métropolitaine (45,1).

Pour le cancer du sein, on observe la tendance inverse, avec un taux de mortalité dans l'aire (28,4 pour 100 000) plus bas que dans l'Oise (36,6), la Picardie (37,3) et la France métropolitaine (33,2).

Le taux de mortalité par cancer des voies aéro-digestives supérieures (VADS) est par contre plus élevé dans l'aire que dans les trois zones de référence.

## Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Les affections psychiatriques de longue durée ont entraîné plus d'admissions en ALD dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée (143,2) qu'aux niveaux départemental (139,6) et régional (131,9) mais moins qu'au niveau national (169,8).

Le taux d'admissions en ALD pour maladie d'Alzheimer est par contre plus faible dans l'aire que dans les trois zones de référence.

En 2006, 23,7 % des assurés de Saint-Just-en-Chaussée ont été remboursés au moins une fois pour des psychotropes, soit plus que dans l'Oise (22,1 %), mais moins qu'en Picardie (24,1 %).

## Prévention

**Dépistages** : le dépistage organisé du cancer du sein a une meilleure couverture dans l'aire (52,0 % des femmes de 50 à 74 ans) que dans l'Oise (43,8 %), qu'en Picardie (45,5 %) et qu'en France entière (47,1 %). Inversement, une proportion moindre de femmes a bénéficié d'un frottis en 2006 dans l'aire (21,1 %, contre 24,2 % dans l'Oise).

**Périnatalité** : 14,7 % des femmes de l'aire ayant accouché en 2000-2003 ont eu moins de sept consultations prénatales, ce qui est largement plus que dans l'Oise (10,7 %) mais un peu moins qu'en Picardie (15,7 %).

**Vaccination** : la vaccination anti-grippale est plutôt bien suivie dans l'aire de Saint-Just-en-Chaussée (69,7 % des 65 ans et plus), *idem* pour les vaccinations infantiles (ROR et BCG).

**Actes dentaires** : le suivi dentaire des enfants de 12 ans de l'aire est largement inférieur aux taux isarien (26,4 % des enfants de 12 ans contre 33,7 % dans l'Oise) et picard (36,9 %).

Remerciements à la Drass de Picardie,  
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,  
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,  
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en janvier 2009  
Il a été rédigé et mis en page par Anne Lerat, Anne Ducamp,  
Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),  
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),  
et Danielle Fontaine (DRSM).